

Мастопатия с гипофизарной недостаточностью.

Курс 12 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую зону.

1 день.

Е 36 л - V 60 п - VB 37 л

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

Е 10 л - V 46 п - VG 19 (не парная)

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

Е 12 л - TR 12 п - VG 25 (не парная)

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

RP 6 л - VB 34 п - VB 21 л

8 день.

Те же точки, но меняются точки.

9 день.

Е 30 л - V 52 п - VC 3 л

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

11 день.

Е 45 л - VB 41 п - TR 3 л

12 день.

Те же точки, но меняются местами.

Курс проводится 1 раз в 2-3 месяца, в промежутке между КВЧ целесообразно применять ФРТ на точки TR 2 VG 20 VG26 1 раз в день по одной точке.

Мастопатия с большими болезненными зонами.

Курс 12 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую зону.

1 день.

Р7 л -V46 п -F8 л

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

GI 11 л -R 7 п -TR 2 л

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

РР 2 л – VB 41 п – МС 6 л

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

РР 6 л – V 60 п – VC 3(не парная)

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

Е 12 л – V 40 п – TR 12 л

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

11 день.

Е 15 л – Р 5 п – IG 15 л

12 день.

Те же точки, но меняются стороны.

На зону боли можно использовать ИК-излучатель и излучатель 2Ф. Лечение инфракрасным излучателем и излучателем 2Ф можно проводить одновременно со SMAR-терапией. Повторный курс проводится через 2-3 месяца.

Мастопатия поликистозная с мелкими диффузными узлами, не болезненная (с нормальной функцией щитовидной железы).

Курс 12 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

Е 12 л – GI 11 п – TR 2 л

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

Е 15 л – V 46 п – VB 41 л

4 день.

Те же зоны, но меняются стороны.

5 день.

Е 30 л – V 11 п – TR 12 л

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

RP 6 л – V 17 п – MC 6 л

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

RP 4 л – P 2 п – F 8 л

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

11 день.

RP 2 л – MC 3 п – VG 14 (не парная)

12 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Повторный курс проводится через 2-3 месяца, в промежутке между курсами КВЧ целесообразно применять ФРТ на точку Е 41 два раза в неделю.

Эрозия, дисплазия слизистой оболочки шейки матки.

Курс 8 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У с 5 по 15 день менструального цикла.

1 день.

Е 36 л – F 2 п – VC 4 (не парная)

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

V 37 л – VB 12п – TR 20 л

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

VG 4 (не парная) – VC 22 (не парная) – V 65 л

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

VC 3 (не парная) – E 30 л – VG 14 (не парная)

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Повторный курс проводится через 2-3 месяца.

Пролапс матки (опущение, выпадение).

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

RP 4 л- F 8 п – VC 3 (не парная)

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

F 1 л – VG 4 (не парная)- R 4 – п

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

E 30 л – V 31 п – VG 14 (не парная)

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

V 32 л – V 46 п – TR 10 л

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

PR 9 л – R 3 п – VB 34 л

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

11 день.

RP 10 л – R 7 п – TR 21 л

Курсы проводятся 2-3 года в год, между курсами целесообразно проводить ФРТ на точки VB 34 и VG 4.

Метроррагия (обильные месячные, кровотечение).

Курс 6 дней.

Применяется как неотложная помощь.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У на каждую точку по 10 минут.

1 день.

RP 6 л – V 55 п – F 3 л

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

RP 10 л – R 7 п – F 2 л

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

R 10 л – F 5 п – C 5 л

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Так же можно проводить ФРТ на точку VC 3, делать перезапись при изменении ситуации.

Бесплодие при смещении матки.

Курс 10 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У на каждую точку по 10 минут.

1 день.

Е 29 л – V 35 л

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

Е 30 л – VB 34 п

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

Е 32 л – V 37 п

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

R 16 л – VG 14 (не парная)

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

Е 30 л – V 31 п

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Курс проводится 1 раз в 2-3 месяца, между курсами целесообразно проводить ФРТ на точку VC 3 1 раз в день.

Бесплодие.

Курс 12 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

Е 36 л – R18 п – VC 4 (не парная)

2 день.

Те же точки. Но меняются стороны.

3 день.

RP 6 л – VC 3 (не парная) – VG 20

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

E 32л – V 31 п – VG 4 (не парная)

6 день.

Те же точки, но меняются местами.

7 день.

V 33 л – R 16 п – F 2 л

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

V 18 л – VB 39 п – VC 7 (не парная)

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

11 день.

RP 4 л – R 19 п – VC 3 (не парная)

12 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Курс проводится 2-3 раза в год, между курсами целесообразно проводить ФРТ на точки VC 3, R 3, V 31.

Фригидность(потеря либидо).

Курс 12 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

E 36 л – F 8 п – VG 2 (не парная)

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

E 32 л – VB 41 п – VG 14 (не парная).

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

Е 30 л – F 3 п - TR 3 л

6 день.

Те же точки, но стороны.

7 день.

Е 45 л – VC 3 (не парная) – VC 14 (не парная)

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

PR 6 л – R 10 п – C 7 л

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

11 день.

PR 9 л – VB 12 п – V 8 л

12 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Курс проводится 2-3 раза в год.

Климактерический синдром.

Курс 10 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

Е 36 л – MC 7 п – VC 12 (не парная)

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

PR 4 л – R 7 п – VB 10 (не парная)

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

Е 30 л – MC 6 п – VG 14 л

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

GI 11 л – TR 5 п – VG 20 л

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

RP 9 л – TR 2 п – VG 14 л

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Курс проводится 1-2 раза в год.

Ожирение при климаксе.

Курс 10 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

E 36 л – V 10 п – VB 20 л

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

E 9 к – GI 3 п – R 3 л

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

E 12 л – VB 34 л – VG 10 (не парная)

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

RP 6 л – R 6 п – TR 13 л

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

VG 25 (не парная) – F 8 л – VG 14 (не парная)

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Курс проводится 1 раз в 2-3 месяца.

Молочница (вагинальный кандидоз).

Курс 8 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

VC 3 (не парная) – F 13 л – V 50 п

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

RP 4 л – F 8 л – V 60 л

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

E 30 – R 6 п – VB 41 л

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

RP 6 л – GI 11 п – VG 14 (не парная)

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Как правило достаточно 1 курса, но при необходимости можно повторить через 2-3 месяца.

Также необходимо проводить ФРТ в течение 14 дней :

Переносить информацию с выделений на воду, пить 3 раза в день по 50 мл и информацию с розмарина (трава, приправа)

Запись производится в течение 7 секунд.

С точки VC 3 снять информацию излучателем и перенести на воду, излучатель поставить обратно на точку.

Недостаточность яичников (месячные вялые, мажущие, длительные).

Курс 10 дней.

Проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

Проводится с 5 по 15 день менструального цикла.

1 день.

F 8 л – R 13 п – VC 3 (не парная)

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

RP 6 л – F 11 п – VC 7 (не парная)

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

R 3 л – V31 п – VC 22 (не парная)

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

R 3 л – TR 1 п – VG 10(не парная)

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

GI 11 л – V 50 п – VC 3 (не парная)

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Курс проводится 1 раз в 2-3 месяца.

ФРТ можно делать во время курса и между курсами.

С точки V 31 сделать запись в течение 10 секунд и оставить на том же месте чередуя, один день – слева, другой день справа с 5 по 15 день цикла.

Так же сделать запись с месячных и ставить на точку VC 3.

Воспалительные заболевания внутренних половых органов (аднексит, эндометрит, сальпингит).

Курс проводится в прямом SMAR-режиме излучателем 1У по 10 минут на каждую точку.

1 день.

E 36 л – V 23 п – VC 20 л

2 день.

Те же точки, но меняются стороны.

3 день.

RP 6 л – GI 11 л – F 8 л

4 день.

Те же точки, но меняются стороны.

5 день.

RP 9 л – R 7 п – VC 2 л

6 день.

Те же точки, но меняются стороны.

7 день.

E 39 л – V 30 п – VG 4 п

8 день.

Те же точки, но меняются стороны.

9 день.

E 37 л – R 6 п – VC 4 л

10 день.

Те же точки, но меняются стороны.

11 день.

E 30 л – VB 41 п – VG 14 (не парная)

12 день.

Те же точки, но меняются стороны.

Повторный курс, при необходимости, проводится через 2-3 месяца.

Так же необходимо проводить ФРТ 1-2 раза в сутки на место боли

Миомы, фибромы (до 12 недель), при сохраненном менструальном цикле с 5 дня, при отсутствии на убывающей луне.

